

SUTENT**(su TENT)**

Lea la hoja de información para el paciente que acompaña SUTENT antes de comenzar a tomarlo. Lea esta hoja cada vez que le vuelvan a surtir el medicamento. Es posible que contenga información nueva. Esta hoja no sustituye la consulta con el médico sobre su enfermedad o tratamiento. Si tiene alguna pregunta sobre SUTENT, pregunte al médico o al farmacéutico.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre SUTENT?

- **SUTENT puede causar daños (defectos de nacimiento) al feto.** No debe quedar embarazada. Si queda embarazada, dígaselo al médico de inmediato. Deje de tomar SUTENT.

¿Qué es SUTENT?

SUTENT es un medicamento que se usa para tratar 2 tipos de cáncer.

1. **Tumor estromal gastrointestinal (GIST, por sus siglas en inglés).** Este es un cáncer poco frecuente del estómago, el intestino o el esófago. SUTENT se usa cuando el medicamento Gleevec® (imatinib mesilato) no logró detener el crecimiento del cáncer O BIEN cuando no puede tomar Gleevec®.
2. **Cáncer de riñón avanzado** (carcinoma de células renales avanzado, o RCC, por sus siglas en inglés). SUTENT puede enlentecer o detener el crecimiento del cáncer. Puede ayudar a encoger tumores. SUTENT no se ha estudiado en niños.

SUTENT puede enlentecer o detener el crecimiento del cáncer. Puede ayudar a encoger tumores.

SUTENT no se ha estudiado en niños.

¿Qué debo decirle al médico antes de comenzar a tomar SUTENT?

Dígale al médico todos los problemas de salud que tiene. **No olvide decirle al médico si:**

- está embarazada, podría estar embarazada o planea quedar embarazada. SUTENT podría causar daños al feto.
- está amamantando. No amamante mientras esté recibiendo tratamiento con SUTENT.
- tiene problemas cardíacos
- tiene presión arterial alta
- tiene problemas de funcionamiento de los riñones (además del cáncer)
- tiene problemas de hígado
- tiene problemas de hemorragias (sangrado)
- tiene convulsiones

SUTENT y otros medicamentos

Dígale al médico qué otros medicamentos está tomando. Incluya los **medicamentos bajo receta**, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los productos de hierbas. Algunos medicamentos pueden reaccionar con SUTENT y causar efectos secundarios graves. Especialmente dígame al médico si toma:

- St. John's Wort (hierba de San Juan). **No tome St. John's Wort mientras esté tomando SUTENT.**
- Dexametasona (un corticosteroide)
- Medicamentos para
 - la tuberculosis (TB)
 - infecciones (antibióticos)
 - las convulsiones (epilepsia)
 - infecciones micóticas (antimicóticos o antifúngicos)
 - VIH (SIDA)
- depresión

Tenga una lista de sus medicamentos. Muéstresela al médico o al farmacéutico. Hable con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SUTENT?

Los posibles efectos secundarios graves incluyen:

- **Problemas cardíacos.** Dígame al médico si está muy cansado, le falta el aire o tiene los pies y los tobillos hinchados.
- **Eventos muy infrecuentes que pueden resultar mortales:** orificio en la pared del estómago o del intestino (perforación) o que el tumor sangre.

Gleevec® es una marca comercial de Novartis Pharmaceuticals Corp
Sólo bajo receta

Estos dos efectos secundarios podrían causar síntomas como dolor o hinchazón de abdomen, vomitar sangre, y heces negras y pegajosas. Su médico puede decirle a qué otros síntomas debe estar atento.

- **Aumento de la presión arterial.** Su médico puede vigilarle la presión arterial. Quizá necesite tratamiento para la presión arterial alta.

Efectos secundarios comunes:

- Sensación de cansancio
- Diarrea, náuseas, vómitos, llagas en la boca, malestar estomacal, dolor abdominal y estreñimiento. Hable con el médico sobre cómo tratar estos problemas.
- El medicamento que contiene SUTENT es amarillo, lo que podría hacer que su piel se torne amarilla. Es posible que se le aclare la piel y el cabello.
- También es posible que la piel se seque, se ponga más gruesa o se agriete. Es posible que le salgan ampollas o tenga sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies.
- Cambios en el sentido del gusto
- Falta de apetito
- Pérdida de sangre, como hemorragias nasales o sangrar de un corte. Llame al médico si tiene hinchazón o si sangra.

- Hinchazón
- Presión arterial alta

Podría tener otros efectos secundarios. Si desea una lista más completa, pregunte al especialista en cáncer (médico o enfermero).

¿Cómo debo tomar SUTENT?

- SUTENT viene en cápsulas de 12.5 mg, 25 mg, y 50 mg que se toman por la boca. No abra las cápsulas.
- Tome SUTENT una vez al día con o sin alimentos.
- Tómelo exactamente como le diga el médico.
- No beba jugo de toronja ni coma toronja. Podría modificar la cantidad de SUTENT que tiene en el organismo.
- **Ciclo de administración:**
 - Tome SUTENT durante 4 semanas (28 días) LUEGO
 - Deje de tomarlo durante 2 semanas (14 días)
 - Repita este ciclo durante todo el tiempo que su médico le indique
- Su médico puede controlarle la presión arterial antes de cada ciclo de dosis.
- Si se salta una dosis, tómela en cuanto lo recuerde. No la tome si falta poco para su próxima dosis. Sólo tome la siguiente dosis en el horario habitual. No tome más de 1 dosis de SUTENT a la vez. Dígame al médico o enfermero que se olvidó de tomar una dosis.
- Llame al médico de inmediato si toma demasiado SUTENT.

¿Cómo guardo SUTENT?

- Guarde SUTENT y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Guarde SUTENT a temperatura ambiente.

Información general sobre SUTENT

Los médicos pueden recetar medicamentos para enfermedades que no se mencionan en esta hoja de información para el paciente. Use SUTENT sólo para lo que le indicó el médico. No se lo dé a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede causarles daño.

Esta hoja le brinda sólo la información más importante sobre SUTENT. Si desea más información sobre SUTENT, hable con su médico o farmacéutico. Puede visitar nuestro sitio web en www.SUTENT.com.

¿Qué contiene SUTENT?

Ingrediente activo: maleato de sunitinib

Ingredientes inactivos: manitol, croscarmelosa sódica, povidona (K-25), estearato de magnesio. **Cubierta de la cápsula de gelatina naranja:** dióxido de titanio, óxido de hierro rojo. **Cubierta de la cápsula de gelatina marrón claro:** óxido de hierro amarillo, óxido de hierro negro. **Leyenda impresa en tinta:** shellac, propilenglicol, hidróxido de sodio, povidona, dióxido de titanio

Distribuido por:

Pfizer Labs
Una división de Pfizer Inc
New York, NY 10017